

Крок М Сестринська справа **Медсестринство в акушерстві**

1

При зовнішньому акушерському обстеженні вагітної в терміні 36 тижнів встановлено: над входом в малий таз визначається округла, помірної щільності балотуюча частина плода. Спинка плода зліва. Якому визначенню за акушерською термінологією відповідають отримані дані акушерського дослідження?

- A** *I позиція, головне передлежання
- B** II позиція, головне передлежання
- C** I позиція, сідничне передлежання
- D** II позиція, сідничне передлежання
- E** Поперечне положення

2

Після завершення фізіологічних пологів породілля знаходиться в пологовій залі під наглядом медичної сестри. Яка тривалість раннього післяпологового періоду?

- A** *2 години
- B** 3 години
- C** 6 годин
- D** 24 години
- E** 48 годин

3

Роділля знаходиться в пологовій залі. Завершився I період пологів. Які ознаки вказують на його завершення?

- A** *Повне відкриття шийки матки
- B** Народження посліду
- C** Відкриття шийки матки на 3 см
- D** Постійний ниючий біль
- E** Народження плода

4

Породілля виписана з пологового будинку. Протягом якого терміну медсестра повинна зробити патронаж?

- A** *Протягом 3 днів після виписки породіллі із пологового будинку
- B** Протягом 3-х тижнів після виписки породіллі із пологового будинку
- C** Протягом місяця після виписки породіллі із пологового будинку
- D** Протягом 3 місяців після виписки породіллі із пологового будинку
- E** Протягом 14 днів після виписки породіллі із пологового будинку

5

Медична сестра визначає достовірні ознаки вагітності. Який метод обстеження вона повинна застосувати?

- A** *Прийоми Леопольда-Левицького
- B** Призначення сечі на наявність ХГ
- C** Вимірювання обводу живота
- D** Бімануальне обстеження
- E** Огляд шийки матки у дзеркалах

6

Вагітна М., 31 року, під час зовнішнього обстеження проведено вимірювання ОЖ, що дорівнює 90 см і ВСДМ- 30 см. Яка передбачувана маса плода?

- A** *2700 г
- B** 3100 г
- C** 3000 г
- D** 2900 г

E 2500 г

7

Роділля Н., 26 років, поступила у акушерський стаціонар із нормальною пологовою діяльністю і через три години народила живу доношену дівчинку масою 3200 г. Затискач, накладений на материнський відрізок пуповини біля статевої щілини, опустився на 10-12 см. Яка ознака відшарування плаценти є позитивною в цьому випадку?

- A** *Альфельда
- B** Кюстнера-Чукалова
- C** Шредера
- D** Довженка
- E** Клейна

8

Вагітна Л., 29 років, у терміні вагітності 32 тижні, звернулась до лікаря ж/к зі скаргами на швидку втомлюваність, спрагу. Вага жінки за тиждень збільшилась на 650 грамів. Вкажіть допустиму прибавку ваги за тиждень.

- A** *350 грамів
- B** 250 грамів
- C** 450 грамів
- D** 550 грамів
- E** 650 грамів

9

У післяпологовому відділенні медична сестра здійснює I етап сестринського процесу. Що із нижчепереліченого належить до суб'єктивного обстеження пацієнтки:

- A** *Бесіда з породіллею
- B** Вимірювання температури
- C** Визначення частоти пульсу
- D** Оцінка характеру лохий
- E** Визначення рівня гемоглобіну в крові

10

Вагітна 25 років звернулася в жіночу консультацію для взяття на облік. При вимірюванні зовнішніх розмірів тазу отримали дані: 26-28-31-20. Який таз у жінки?

- A** *Нормальний
- B** Чоловічий
- C** Плоскоряхітичний
- D** Простий плоский
- E** Загальнорівномірнорозвужений

11

Вагітна 20 років. При зовнішньому акушерському обстеженні визначено, що спинка плода розташована праворуч. Вкажіть позицію плода?

- A** *Друга
- B** Перша
- C** П'ята
- D** Четверта
- E** Третя

12

У вагітної до початку пологової діяльності відійшли навколоплідні води. Про яке відходження вод їде мова?

- A** *Передчасне
- B** Ранне

- C** Своєчасне
- D** Запізніле
- E** -

13

Вагітна в терміні 7 тижнів, скарги на блювання 4-6 разів на добу, нудоту, відразу до їжі. Вкажіть пріоритетну проблему у даної пацієнтки?

- A** *Блювання вагітної
- B** Відраза до продуктів харчування
- C** Порушення засвоєння їжі
- D** Порушення режиму сна
- E** Отруєння

14

Пацієнтка 20 років звернулася в жіночу консультацію зі скаргами на затримку менструації протягом 2-х місяців, зміни апетиту, нудоту. Лікарем установлена вагітність 7-8 тижнів. Назвати документ, який оформляється при взятті на облік по вагітності?

- A** *Індивідуальна карта вагітної і породіллі
- B** Обмінна карта
- C** Амбулаторна карта
- D** Історія пологів
- E** Контрольна карта диспансерного спостереження

15

На 3-й день после родов у родильниці поднялась температура – 38°C, боль в молочной железе. Медсестра осмотрела родильницу: в левой молочной железе пальпируется уплотнение 7х6, болезненное, над ним гиперемия, отек. Каковы действия медсестры по реализации плана медсестринского вмешательства?

- A** *Пузырь со льдом на область молочной железы, вызвать врача
- B** Ввести анальгетики
- C** Грелка на область молочной железы
- D** Ввести жаропонижающие средства
- E** Компресс на молочную железу

16

Роженица Н., в III периоде родов, признаки Альфельда, Шредера положительные. Что должна сделать медсестра для реализации плана медсестринских вмешательств?

- A** *Предложить роженице потужиться
- B** Потянуть за пуповину
- C** Провести наружный массаж матки
- D** Измерить АД
- E** Применить метод Абуладзе

17

У беременной 27 лет, при тазометрии выявилось, что размеры таза составили 26-29-31-20. Индекс Соловьева - 14,5 см. Определите истинную конъюгату.

- A** *11 см
- B** 12 см
- C** 9 см
- D** 10 см
- E** 13 см

18

У пологовий будинок госпіталізовано роділлю, яка народжує вперше у терміні вагітності 38-39 тижнів з кровотечею зі статевих органів. При піхвовому дослідженні: шийка матки згладжена, відкрита на один поперечний палець, внутрішнє вічко повністю закрито

губчастою тканиною. Яка патологія спостерігається у роділлі?

- A** *Центральне передлежання плаценти
- B** Бокове передлежання плаценти
- C** Крайове передлежання плаценти
- D** Низьке прикріплення плаценти
- E** Шийна вагітність

19

Першороділля 20 років на третій день після термінових пологів скаржитья на підвищення температури до 39°C, озноб, біль внизу живота, гнійно-кров'янисті виділення зі статевих органів. Яке ускладнення виникло у породіллі?

- A** *Післяпологовий ендометрит
- B** Лохіометра
- C** Аднексит
- D** Перитоніт
- E** Післяпологова виразка

20

Під час огляду вагітної медична сестра виміряла зовнішні розміри тазу, вони дорівнюють 25-29-30-20. Який висновок відносно тазу зробила медична сестра?

- A** *Нормальний таз
- B** Простий плоский таз
- C** Плоскорохітичний таз
- D** Загальнозвужений таз
- E** Поперечнозвужений таз

21

До пологового будинку госпіталізовано жінку в строку вагітності 37-38 тижнів. ВСДМ- 40 см. Над входом в малий таз визначається велика частина, що балотує, та багато дрібних частин. Вислуховується чітке серцебиття плода зліва нижче пупка 136 за 1 хв., та праворуч вище пупка 140 за 1 хв. Про що йде мова?

- A** *Багатоплідна вагітність
- B** Гідроцефалія плода
- C** Гігантський плід
- D** Розгинальне передлежання
- E** Тазове передлежання

22

У пологовий будинок поступила роділля. Пологи II, термінові. Розміри тазу 23-26-28-17 см. Пологова діяльність почалась 8 годин тому. Роділля неспокійна. Перейми часті, болючі. Матка у вигляді "піщаного годинника". Ознака Вастена позитивна. Яке ускладнення виникло у роділлі?

- A** *Загроза розриву матки
- B** Розрив матки, що розпочався
- C** Розрив матки, що відбувається
- D** Тетанус матки
- E** Звуження тазу III ступеню

23

У роділлі відійшли навколоплідні води при розкритті шийки матки на 4 см. Як називають таке відходження навколоплідних вод?

- A** *Ранне
- B** Вчасне
- C** Передчасне
- D** Запізніле
- E** Високий надрив плодового міхура

24

Роділля К., 26 р. Пологи II. III період. Ознак відокремлення посліду немає. Яка тривалість послідового періоду?

- A** *30 хвилин
- B** 15 хвилин
- C** 60 хвилин
- D** 45 хвилин
- E** 40 хвилин

25

Медична сестра проводить вимірювання зовнішніх розмірів тазу. Що характерно для загальнорівномірнозвуженого тазу?

- A** *Всі розміри зменшені на однакову величину
- B** Вкорочені прямі розміри тазу
- C** Вкорочені поперечні розміри тазу
- D** Вкорочені усі косі розміри тазу
- E** Зменшення прямого розміру входу в малий таз

26

Патронажна медична сестра при обстеженні вагітної встановила, що спинка плода розташована з лівого боку матки, над входом в малий таз пальпується щільна, "балотуюча", крупна частина плода. Визначте положення, позицію та передлежання плода.

- A** *Повздожнє положення, перша позиція, головне передлежання
- B** Повздожнє положення, друга позиція, головне передлежання
- C** Повздожнє положення, перша позиція, тазове передлежання
- D** Поперечне положення, друга позиція
- E** Повздожнє положення, друга позиція, тазове передлежання

27

Під час вимірювання тазу при взятті вагітної на облік медсестрою встановлені наступні розміри: 24-26-28-18см. Назвіть форму тазу вагітної.

- A** *Загальнорівномірнозвужений таз
- B** Поперечнозвужений таз
- C** Косозміщений таз
- D** Плоский таз
- E** Звужений таз

28

У породіллі в післяпологовому періоді медична сестра виявила кровотечу зі статевих шляхів. Кровотрата під час пологів склала 450мл. Розривів м'яких тканин родового каналу немає, послід цілий. Матка періодично скорочується і розслабляється. Кров, що витікає з матки, утворює згортки. Яка найбільш вірогідна патологія, що зумовлює таку картину?

- A** *Гіпотонічна маткова кровотеча
- B** ДВЗ-синдром
- C** Атонічна кровотеча
- D** Розрив матки
- E** Емболія навколоплідними водами

29

Першовагітна прийшла на черговий прийом у жіночу консультацію. Із анамнезу - перші рухи плода відчула 4 тижні тому. Дно матки на рівні пупка. Визначте термін вагітності:

- A** *24 тижні
- B** 20 тижнів
- C** 16 тижнів
- D** 28 тижнів

E 32 тижні

30

Роділля М., 26 років, I період пологів. Як часто медична сестра визначає параметри пульсу і артеріального тиску у роділлі?

- A** *Кожні 2 години
- B** Кожні 4 години
- C** Кожні 6 години
- D** Кожну годину
- E** Кожні 30 хвилин

31

У пацієнтки діагностували набряки вагітної. Складаючи план сестринського догляду Ви оберете:

- A** *Щотижневе зважування вагітної
- B** Підрахунок частоти дихання
- C** Підрахунок частоти серцевих скорочень
- D** Вимірювання температури тіла
- E** Визначення внутрішньоутробної маси плода

32

На стаціонарному лікуванні знаходиться пацієнтка Г. 35 років, з приводу загрози переривання вагітності у терміні 10 тижнів. В ході планування медсестринського догляду, медична сестра повинна звернути увагу на:

- A** *Наявність кров'янистих виділень із піхви
- B** Показники температури тіла
- C** Показники артеріального тиску
- D** Частоту серцевих скорочень
- E** Наявність апетиту

33

Породіллі проведений курс лікування з приводу післяпологового маститу. При оцінці результатів медсестринських втручань Ви в першу чергу звернули увагу на:

- A** *Зникнення ущільнення та гіперемії молочних залоз
- B** Нормалізацію лактації
- C** Нормалізацію сну
- D** Покращення апетиту
- E** Покращення самопочуття

34

При взятті мазка на визначення ступеню чистоти піхвового вмісту виявлено: паличок Додерлейна мало, багато лейкоцитів, переважно кокова флора, реакція вмісту піхви слаболужна. Це характерно для:

- A** *III ступеню чистоти піхвового вмісту
- B** I ступеню чистоти піхвового вмісту
- C** II ступеню чистоти піхвового вмісту
- D** IV ступеню чистоти піхвового вмісту
- E** V ступеню чистоти піхвового вмісту

35

При обстеженні вагітної прийомами зовнішнього акушерського дослідження визначено, що дно матки розташоване на рівні пупка. При одноплідній вагітності це відповідає:

- A** *24 тижням вагітності
- B** 36 тижням вагітності
- C** 28 тижням вагітності
- D** 32 тижням вагітності

E 40 тижням вагітності

36

Під час зовнішнього акушерського дослідження вагітної виявлено: положення плода повздожнє, перша позиція, передній вид, головне передлежання. Вкажіть найкраще місце вислуховування серцебиття плода.

- A** *Нижче пупка ліворуч
- B** Вище пупка праворуч
- C** Нижче пупка праворуч
- D** Вище пупка ліворуч
- E** На рівні пупка

37

У пацієнтки 28 років під час профілактичного огляду було виявлено гіперемію в ділянці зовнішнього вічка шийки матки. Подальша тактика медичної сестри:

- A** *Направити до лікаря гінеколога
- B** Призначити спринцювання
- C** Призначити піхвові ванночки
- D** Призначити заспокійливі
- E** Зробити посів піхвових виділень

38

Роділля поступає в пологовий будинок. Для визначення очікуваної маси плода медсестра вимірює обвід живота. На якому рівні слід розмістити сантиметрову стрічку?

- A** *На рівні пупка
- B** Посередині між пупком і мечоподібним відростком
- C** На три поперечні пальці нижче пупка
- D** На два поперечні пальці вище пупка
- E** На рівні висоти стояння дна матки

39

Роділля ,34 років, доставлена машиною швидкої допомоги в пологовий будинок. Пологи в строк. За яким показником медична сестра оцінить початок пологової діяльності?

- A** *За частотою та тривалістю перейм
- B** За станом роділлі
- C** За станом плода
- D** За часом вилиття навколоплодових вод
- E** За станом плодового міхура

40

Другий період пологів. Голівка плода прорізується. Яке залежне сестринське втручання потрібно виконати з метою профілактики кровотечі в III періоді пологів?

- A** *Ввести метилергометрин
- B** Ввести вікасол
- C** Ввести дицинон
- D** Ввести маммофізин
- E** Ввести анальгін

41

У породіллі на третю добу післяпологового періоду з'явилися скарги на болі в молочних залозах. Молочні залози значно та рівномірно збільшені, нагрудні, болючі при пальпації, при натисканні з сосків виділяються крапельки молока. Яке медсестринське втручання потрібно виконати в першу чергу?

- A** *Спорожнити молочні залози шляхом зціджування
- B** Обмежити пиття
- C** Імобілізувати молочні залози

- D** Компрес на молочні залози
- E** Ввести знеболюючий препарат

42

Медсестра готує вагітну до УЗД. Що доцільно провести для реалізації плану медсестринського втручання?

- A** *Провести роз'яснення в плані підготовки
- B** Виміряти АТ, Рс
- C** Обмеження гострої їжі
- D** Обмеження вживання рідини
- E** Провести бесіду з родичами

43

У післяпологовому відділенні медсестра проводить бесіду з породіллею. На які проблеми породіллі треба звернути увагу?

- A** *Скарги породіллі з боку статевих органів та молочних залоз
- B** Скарги породіллі на підвищену пітливість
- C** Скарги породіллі на підсилення апетиту
- D** Скарги породіллі на сонливість
- E** Скарги породіллі на відчуття спраги

44

Першороділля 23-х років народила живого доношеного хлопчика вагою 3200 г. Через 30 хвилин після народження дитини ознаки відокремлення плаценти позитивні, крововтрата 110 мл. Які наступні дії при веденні пологів у даної жінки?

- A** *Запропонувати роділлі потужитись
- B** Ввести в/в 1 мл окситоцину
- C** Застосувати зовнішній прийом по Креде-Лазаревічу
- D** Застосувати зовнішній прийом по Гентеру
- E** Провести ручне виділення посліду

45

У вагітної 35 років, в терміні вагітності 20 тижнів було зафіксовано патологічну прибавку у вазі. Яке обстеження необхідно провести для виявлення прихованих набряків при підозрі прегестозу?

- A** *Проба Мак-Клюра-Олдріча
- B** Вимірювання артеріального тиску на обох руках
- C** Визначення білку в сечі
- D** Визначення сечовини та креатиніну
- E** УЗД

46

Ви проводите заняття в жіночій консультації з питань статевого здоров'я. Обговорюючи фази нормального менструального циклу, ви повідомите про зміни, що відбуваються в яєчниках під час овуляції, а саме:

- A** *Розрив фолікула і вихід яйцеклітини
- B** Утворення жовтого тіла менструації
- C** Продукування прогестерону
- D** Утворення жовтого тіла вагітності
- E** Створення умов для імплантації

47

Під час обстеження вагітної в терміні 36 тижнів Ви з'ясували, що поздовжня вісь плоду утворює з поздовжньою віссю матки прямий кут. Про яке положення плода іде мова?

- A** *Поперечне
- B** Косе

- C* Поздовжне
- D* Лобне
- E* Тазове

48

Ви проводите зовнішнє акушерське дослідження за допомогою прийомів Леопольда-Левицького. Дно матки знаходиться посередині між лоном і пупком. Визначте термін вагітності.

- A* *16 тижнів
- B* 12 тижнів
- C* 20тижнів
- D* 30 тижнів
- E* 36 тижнів

49

Ви медична сестра ЖК, приймаєте участь в організації занять з безпечного материнства та батьківства, та інформуєте слухачів про періоди пологів. Які періоди пологів ви знаєте?

- A* *Розкриття, зганяння, послідовий
- B* Прелімінарний, розкриття, послідовий
- C* Прелімінарний, зганяння, послідовий
- D* Провісники, розкриття, зганяння
- E* Розкриття, зганяння, післяпологовий

50

При обстеженні жінки з терміном 24 тижні була запідозрена багатоплідна вагітність. Який метод обстеження підтвердить багатопліддя?

- A* *Вислуховування серцебиття плода в двох пунктах
- B* Вимірювання ОЖ і ВДМ
- C* Вимірювання пульсу і АТ жінки
- D* вислуховування серцебиття в одному пункті
- E* вимірювання розмірів тазу

51

Породілля 25 років перебуває у індивідуальній пологовій палаті. Друга доба післяпологового періоду. Які показники будуть засвідчувати про фізіологічний перебіг цього періоду?

- A* * АТ – 120/75 мм рт.ст., пульс – 64 уд./хв., t – 36,7°C, дно матки на рівні пупка, щільної консистенції, лохії кров'янисті
- B* АТ - 100/60 мм рт.ст., пульс – 80 уд./хв., t – 37,8°C, дно матки на рівні пупка, щільної консистенції, лохії кров'янисто-слизові
- C* АТ – 110/60 мм рт.ст., пульс – 70 уд./хв., t – 36,6°C, дно матки вище пупка, розм'якшена, лохії кров'янисті
- D* АТ – 125/85 мм рт.ст., пульс – 70 уд./хв., t – 36,6°C, дно матки нижче пупка, лохії слизові
- E* АТ – 120/75 мм рт.ст., пульс – 64 уд./хв., t – 36,6°C, дно матки за лоном, лохії кров'янисті

52

Медсестра обстежує вагітну жінку в терміні вагітності 36 тижнів. При огляді медсестра звернула увагу, що живіт овоїдної форми, витягнутий в поперечному напрямку. Серцебиття плода – 140 уд./хв., тони ясні, діяльність ритмічна і вислуховується на рівні пупка справа. За допомогою яких прийомів Леопольда-Левицького медсестра може визначити положення та позицію плода?

- A* *I-го і II-го прийомів Леопольда-Левицького
- B* III-го прийому Леопольда-Левицького
- C* I-го прийому Леопольда-Левицького
- D* III-го і IV-го прийомів Леопольда-Левицького
- E* IV-го прийому Леопольда-Левицького

53

В регістратуру жіночої консультації звернулася вагітна жінка з приводу взяття її на облік з приводу вагітності. Який медичний документ, що забезпечує зв'язок жіночої консультації, пологового будинку і вагітної повинна заповнити медсестра?

- A** *Індивідуальну карту вагітної і роділлі
- B** Контрольну карту диспансерного обліку
- C** Журнал обліку вагітності
- D** Медичну картку амбулаторного хворого
- E** Історію пологів

54

В ранньому післяпологовому періоді за призначенням лікаря медсестра внутрішньом'язово ввела породіллі 1мл (5 ОД) окситоцину. Що буде критерієм оцінки результатів медсестринського втручання?

- A** *Підвищення тонуусу матки
- B** Підвищення артеріального тиску
- C** Зниження тонуусу матки
- D** Прискорення пульсу
- E** Зниження артеріального тиску

55

Ви медсестра жіночої консультації, у обов'язки якої входить патронаж породіль. Скільки часу триває післяпологовий період?

- A** *6-8 тижнів
- B** 4-5 тижнів
- C** 2-3 тижні
- D** 1 місяць
- E** 1 рік

56

Роділля 26 років доставлена у пологове відділення з переймами, які почалися 12 годин тому. Перейми слабкі, короткотривалі, повторюються через 12-15 хв. Серцебиття плода 140 уд./хв., ритмічне. При піхвовому обстеженні: шийка згладжена, розкриття 4 см, плодовий міхур цілий, голівка плода притиснута до входу в малий таз. Про яке ускладнення пологів йде мова?

- A** *Первинна слабкість пологової діяльності
- B** Дискоординована пологова діяльність
- C** Надмірно сильна пологова діяльність
- D** Вторинна слабкість пологової діяльності
- E** Загроза розриву матки

57

Ви працюєте у приймальному відділенні пологового будинку. Поступає жінка з доношеною вагітністю. Що свідчить про початок пологів?

- A** *Наявність регулярних перейм
- B** Наявність нерегулярних перейм
- C** Відходження навколопідних вод
- D** Відходження слизової пробки
- E** Опущення дна матки

58

Ви працюєте медичною сестрою в жіночій консультації. Які ознаки відносяться до ймовірних ознак вагітності?

- A** Зміна величини, форми і консистенції матки
- B** Зміна апетиту, смаку, нудота, блювання зранку
- C** Пігментація шкіри на обличчі, навколо сосків, по білій лінії живота

- D** Промацування частин плода
- E** Вислуховування серцебиття плода

59

У породіллі 20 років щойно народилась доношена дитина чоловічої статі. Необхідно провести профілактику офтальмії. Назвіть препарат за допомогою якого здійснюють таку профілактику?

- A** *1% тетрациклінова мазь
- B** Пеніцилін
- C** Преднізолон
- D** Фурацилін
- E** *2% олійний розчин хлорофіліпту

60

У роділлі III період пологів. Через 10 хвилин дно матки відхилилося у бік правого підребр'я. Вкажіть ознаку відділення плаценти.

- A** *Шредера
- B** Альфельда
- C** Довженка
- D** Чукалова-Кюстнера
- E** Абуладзе

61

У першовагітної жінки 24 років терміном 38 – 39 тижнів, з'явився переймоподібний біль внизу живота і попереку по 15-20 секунд через 1-2 години. Як оцінити такі симптоми?

- A** *Прелімінарний період
- B** Перший період пологів
- C** Третій період пологів
- D** Післяпологовий період
- E** Другий період пологів

62

У роділлі К, 25 р. при піхвовому обстеженні шийка матки згладжена, розкриття 4 см; плодовий міхур відсутній, передлегла частина сідниці. Вкажіть період пологів.

- A** *I період пологів
- B** II період пологів
- C** Провісники пологів
- D** III період пологів
- E** Післяпологовий період

63

На прийом у жіночу консультацію звернулась жінка зі скаргами на поганий апетит, нудоту, припинення менструації протягом 2 місяців. Який метод дослідження необхідно провести для виявлення вагітності?

- A** *Огляд в дзеркалах на гінекологічному кріслі
- B** Вимірювання розмірів тазу
- C** Вимірювання висоти стояння дна матки
- D** Вимірювання окружності живота
- E** Вимірювання індексу Соловйова

64

Медична сестра при огляді вагітної жінки визначає розташування плода у порожнині матки. Для цього вона застосовує:

- A** *Прийоми Леопольда
- B** Вимірювання розмірів тазу
- C** Аускультацию плода

- D** Перкусію живота
- E** Вагінальне дослідження

65

Вагітна цікавиться у медичної сестри про термін пологів, якщо перший день останньої менструації був 10.05. Медична сестра визначила очікувану дату пологів:

- A** *17.02
- B** 10.03
- C** 29.03
- D** 20.04
- E** 27.05

66

Породілля, 23 роки, знаходиться у післяпологовому відділенні. Дно матки перебуває на рівні пупка, лохії кров'янисті. Якій добі післяпологового періоду відповідають ці симптоми?

- A** *1-2-й добі
- B** 3-4-й добі
- C** 5-6-й добі
- D** 7-8-й добі
- E** 10-й добі

67

У пологовий будинок доставлено першороділлю 23 років у тяжкому непритомному стані. Зі слів чоловіка, у дружини з'явилися: головний біль, біль у надчеревній ділянці, було блювання, потім почався судомний напад з втратою свідомості. При госпіталізації: свідомість відсутня, обличчя одутле, бліде, повіки набрякли, АТ – 160/100 мм рт.ст. Яка дійсна проблема пацієнтки?

- A** *Судомний напад
- B** Біль голови
- C** Блювання
- D** Одутле обличчя
- E** Гіпертензія

68

Після народження дитини необхідно провести профілактику офтальмії. Який препарат повинна підготувати медсестра?

- A** *Мазь тетрациклінову
- B** Розчин фурацилліну
- C** Розчин йодонату
- D** Розчин сульфацилу натрію
- E** Мазь ністатиніву

69

Жінка 24р., звернулася в жіночу консультацію із скаргами на відсутність менструації (остання була 5 місяців тому). Які ознаки є достовірними для встановлення вагітності?

- A** *Визначення частин плоду
- B** Зміна смаку
- C** Пігментація шкіри обличчя
- D** Припинення менструації
- E** Збільшення матки

70

У жіночу консультацію звернулась жінка зі скаргами на нагрубання молочних залоз, блювоту вранці, затримку місячних на 2 місяці. Який метод обстеження застосувати для підтвердження вагітності?

- A** *Дворучне піхове дослідження
- B** Чотири прийоми Леопольда
- C** Визначення ВСДМ
- D** Аналіз крові
- E** Зважування жінки